

## PIOJOS EN LA CABEZA

**La pediculosis como se denomina a la enfermedad, es la más frecuente y transmisible en la infancia.**

Conviene destacar que padecer una pediculosis no implica necesariamente hábitos higiénicos malos, sin embargo, para erradicarla, evitar su reinfestación y propagación, si dependen de la buena higiene.

### PREVENCIÓN

En cuanto a la prevención, en todos los casos el tratamiento debe incluir al grupo familiar y otros contactos de la persona infestada

- Lavado del cabello.
- Pasar el peine fino para revisar la existencia del piojo o las liendres (huevos de color blanco)
- Mantener el pelo corto

Asimismo, algunas de las pertenencias del infestado no deben usarse como, por ejemplo: peines, cepillo de pelo; evitar el contacto cercano (cabeza a cabeza). Hay **que tener presente que los piojos no vuelan ni saltan.**

**Si caminan y con** mucha habilidad. Los artículos (peines, cepillos, etc.) utilizados los tres días anteriores al tratamiento deben ser esterilizados con agua caliente.

**Los piojos se caracterizan por tener su cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen.**

La pediculosis del cuero cabelludo afecta con mayor frecuencia a los niños, comienza detrás de las orejas y luego se extiende a toda la cabeza, produciendo una picazón y posible irritación por exceso de rascado.

El diagnóstico se efectuó por el hallazgo del parásito y/o liendres (huevos). Las Liendres llegan a su estado adulto al cabo de tres semanas y pueden vivir entre 30 y 40 días.

### ATAQUE DIRECTO

La preocupación por esta enfermedad lleva a la población, que carece de la información necesaria, a recurrir a ciertas sustancias que muchas veces pueden **resultar altamente tóxicas (kerosene, alcohol, etc).**

**Este comportamiento agrava aún más el cuadro de la pediculosis, ya que provoca serios trastornos para la salud.**

Para enfrentar este problema consulte en el Centro Médico y allí le indicaran una loción que al ser aplicada mata al parásito sin provocar daño al cuero cabelludo.